

Bil 13 enzimático

ÁCIDO DEHIDROCÓLICO - METOCLOPRAMIDA
PANCREATINA - SIMETICONA

Digestivo - Antiflatulento

Comprimidos Recubiertos

FÓRMULA: cada Comprimido Recubierto contiene: Ácido Dehidrocólico 100 mg; Clorhidrato de Metoclopramida 10 mg; Pancreatina 5 NF 180 mg; Simeticona 50 mg. Excipientes: Povidona; Anhídrido Silícico Coloidal; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Verde S.; Acetofalato de Polivinilo; Talco; Ácido Esteárico; Dióxido de Titanio; Citrato de Trietilo; Lactosa c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Normorregulador digestivo

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación para adultos se aconseja:

1 comprimido antes o durante las comidas.

CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Como con todo medicamento, no se aconseja la utilización del producto durante el embarazo y la lactancia, hasta tanto los estudios pertinentes demuestren la total inocuidad sobre tales estados.

Interacciones: Se han descripto interacciones medicamentosas solo para la Metoclopramida:

- Neurolépticos: existe sinergia de efectos a nivel del Sistema Nervioso Central.
- Anticolinérgicos: disminuyen la acción de la Metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal.
- Antiparkinsonianos: posible inhibición de la acción de los mismos.
- Digoxina: su absorción puede llegar a disminuir.
- Levodopa, Paracetamol: su absorción puede llegar a aumentar.

REACCIONES ADVERSAS: A las dosis terapéuticas recomendadas, el medicamento es generalmente bien tolerado. En pacientes hipersusceptibles, la Metoclopramida puede

llegar a provocar trastornos leves tales como somnolencia, lasitud, vértigos, cefalea, insomnio, diarrea. Muy raramente, sobre todo en sujetos jóvenes, pueden llegar a presentarse síntomas extrapiramidales (espasmos faciales, movimientos involuntarios, torticolis) que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento. En casos de tratamientos muy prolongados con Metoclopramida, la bibliografía registra la aparición de disquinesias tardías, efectos endócrinos (amenorrea, galactorrea, ginecomastia, hiperprolactinemia) y trastornos depresivos.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS: A las dosis aconsejadas, no han sido descriptos.

Sobredosificación: En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico, aún si no se observara síntoma o signo alguno de intoxicación. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 30 Comprimidos Recubiertos.

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 25 °C).

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BIL 13 ENZIMÁTICO DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro. 19.895.

"La consulta médica regular es uno de los pilares de la Medicina Preventiva. Consulte periódicamente a su médico".

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disposición Nro. 2268/94.

Laboratorios Bagó S.A.

Investigación y Tecnología Argentina

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Tel.: (011) 4344-2000/19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata. Bs. As.

960 893 B
B E 68 096

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

Bagó

www.bago.com.ar