

BAGOVITAL DIGEST

Complemento alimenticio a base de probióticos

Sobres de 2,0 g con polvo para solución oral

Venta Libre. Vía de administración oral

CADA SOBRE CONTIENE

Maltodextrina, Dextrosa, Probióticos (*Lactobacillus rhamnosus*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium lactis*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*). Antiaglutinante (Dióxido de silicio), Regulador de acidez (Ácido ascórbico).

USOS Y APLICACIONES

Es un complemento alimenticio a base de bacterias probióticas, de los géneros *Lactobacillus* y *Bifidobacterium* que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, favoreciendo el desarrollo del sistema inmune.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 1 sobre (2,0 g)

Porción por envase 10 sobres

Tabla de valor nutricional	En 100 g	En 1 porción = 1 sobre	%VDR*
Valor energético [kJ/kcal]	1634/390	33/8	0
Grasas totales [g]	0	0	0
Ácidos grasos saturados [g]	0	0	0
Colesterol [mg]	<5	0	0
Sodio [mg]	20	0	0
Carbohidratos totales [g]	95	2	1
Proteínas [g]	0	0	0
Probióticos [UFC]**			
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	1,7x10 ¹¹	3,3x10 ⁹	-
<i>Bifidobacterium infantis</i>			
<i>Bifidobacterium lactis</i>			
<i>Bifidobacterium bifidum</i>			
<i>Bifidobacterium longum</i>			

* %VDR = % del valor de referencia de nutrientes basado en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal)

** UFC = Unidades Formadoras de Colonias

REACCIONES ADVERSAS

No se han reportado efectos adversos causados por la ingestión de alguno de los componentes de la fórmula en la cantidad aquí declarada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El producto no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento.

Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.

En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar con su médico antes de consumir este producto.



CONTRAINDICACIONES

Pacientes con historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

POSOLOGÍA

Mezclar el contenido de un sobre en un vaso de agua, leche o yogurt. No administrar con líquidos calientes.

Se recomienda tomar de 1 a 2 sobres al día, entre comidas durante 5 – 10 días.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acudir al Centro de Toxicología de Emergencia Médicas. Avda. Gral. Santos c/ Teodoro S. Mongelós. Tel.: (021) 220 418.

PRESENTACIÓN

BagoVital Digest: Envase conteniendo 10 sobres conteniendo 2,0 g de polvo para solución oral.

Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original. Conservar a temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por Toll Manufacturing Services S.L.
Aragoneses, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, España.

Venta autorizada por la DINAVISA. Reg. Sanitario N°
Importado por Laboratorios Bagó del Paraguay S.A. Avda. Rca. Argentina esq. Avda. Mcal. Lopez, Edificio Torre de las Américas, piso 10, oficinas A y B, Asunción, Paraguay. Tel.: (021) 660 060.

D.T.: Q.F. Ma. Rutilia Vargas. Reg. Profesional N° 4.085.

Acondicionador secundario y distribuidor: Inercom Farmacéutica del Paraguay S.A. Tte. Rómulo Ríos c/ Avda. Perú, deposito N° 6, GICAL, Asunción, Paraguay. Tel.: (021) 614 662/3.

